

[einde](#)

Publicatie : 2009-07-28

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

Uitbreiding van de erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen
met toepassingen van gering belang

In toepassing van artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik deelt de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu mede dat de hiernavolgende erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen werden uitgebreid met een toepassing van gering belang :

Handelsbenaming	OKAPI
Erkenningsnummer	7978/B
Samenstelling	5 g/l LAMBDA-CYHALOTHRIN 100 g/l PIRIMICARB
Toepassing van gering belang :	
Teelt	wortelpeterselie (consumptie wortels) (open lucht) (Petroselinum crispum var. tuberosum)
Veiligheidstermijn	7 dagen
Opmerking	- max. 2 toepassingen/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	bladluizen
Toepassingswijze	1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	bladvretende rupsen
Toepassingswijze	1,5 l/ha, 1 toepassing
Driftreducerende maatregelen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Teelt	bieslook (consumptie bladeren en/of stengels) (Allium schoenoprasum)
Veiligheidstermijn	7 dagen
Opmerking	- max. 2 toepassingen/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	bladluizen
Toepassingswijze	1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	bladvretende rupsen
Toepassingswijze	1,5 l/ha, 1 toepassing
Driftreducerende maatregelen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Teelt	dille (consumptie bladeren en/of stengels) (Anethum graveolens)
Veiligheidstermijn	7 dagen

Opmerking	- max. 2 toepassingen/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	bladluizen
Toepassingswijze	1,5 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	bladvretende rupsen
Toepassingswijze	1,5 l/ha, 1-2 toepassingen
Driftreducerende maatregelen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Teelt	engelwortel (consumptie bladeren en/of stengels) (<i>Angelica sylvestris</i>)
Veiligheidstermijn	7 dagen
Opmerking	- max. 2 toepassingen/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	bladluizen
Toepassingswijze	1,5 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	bladvretende rupsen
Toepassingswijze	1,5 l/ha, 1-2 toepassingen
Driftreducerende maatregelen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Teelt	koriander (consumptie bladeren en/of stengels) (<i>Coriandrum sativum</i>)
Veiligheidstermijn	7 dagen
Opmerking	- max. 2 toepassingen/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	bladluizen
Toepassingswijze	1,5 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	bladvretende rupsen
Toepassingswijze	1,5 l/ha, 1-2 toepassingen
Driftreducerende maatregelen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Teelt	kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (<i>Anthriscus cerefolium</i>)
Veiligheidstermijn	7 dagen
Opmerking	- max. 2 toepassingen/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	bladluizen
Toepassingswijze	1,5 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	bladvretende rupsen
Toepassingswijze	1,5 l/ha, 1-2 toepassingen
Driftreducerende maatregelen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Teelt	mierikswortel (open lucht) (<i>Armoracia lapathifolia</i>)

Veiligheidstermijn	7 dagen
Opmerking	- max. 2 toepassingen/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	bladluizen
Toepassingswijze	1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	bladvretende rupsen
Toepassingswijze	1,5 l/ha, 1 toepassing
Driftreducerende maatregelen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Teelt	tuinkers (<i>Lepidium sativum</i>)
Veiligheidstermijn	7 dagen
Opmerking	- max. 2 toepassingen/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	bladluizen
Toepassingswijze	1,5 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	bladvretende rupsen
Toepassingswijze	1,5 l/ha, 1-2 toepassingen
Driftreducerende maatregelen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Teelt	lavas, maggiplant (consumptie bladeren en/of stengels) (<i>Levisticum officinale</i>)
Veiligheidstermijn	7 dagen
Opmerking	- max. 2 toepassingen/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	bladluizen
Toepassingswijze	1,5 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	bladvretende rupsen
Toepassingswijze	1,5 l/ha, 1-2 toepassingen
Driftreducerende maatregelen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Handelsbenaming	BUTISAN S
Erkenningsnummer	7362/B
Samenstelling	500 g/l METAZACHLOOR
Toepassing van gering belang :	
Teelt	mierikswortel (open lucht) (<i>Armoracia lapathifolia</i>)
Toepassingsstadium	na aanaarden - voor opkomst en/of tijdens de vegetatieve rustperiode (einde winter)
Opmerking	maximum 1 toepassing/jaar
Ter bestrijding van	eenjarige grasachtige onkruiden
Toepassingswijze	1,5 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van	eenjarige tweezaadlobbige onkruiden
Toepassingswijze	1,5 l/ha, 1 toepassing
Driftreducerende maatregelen	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Handelsbenaming	CALYPSO
Erkenningsnummer	9352/B
Samenstelling	480 g/l THIACLOPRID
Toepassing van gering belang :	
Teelt	augurk (onder bescherming) (Cucumis sativus)
Veiligheidsstermijn	3 dagen
Opmerking	- Max. 2 toepassingen/ seizoen. - Ook via druppeling kan Calypso nog een negatieve impact hebben op Encarsia formosa. Bijgevolg is het aangeraden om een eventuele correctiebehandeling enkel plaatselijk toe te passen.
Ter bestrijding van	witte vliegen
Toepassingswijze	20 ml/1000 planten. De oplossing wordt meegedruppeld in het kraanvlak.
Toepassingsstadium vijand	als noodmaatregel bij uitbraak van witte vlieg indien er onevenwicht is in de biologische bestrijding d.m.v. Encarsia, Eretmocerus, Macrolophus
Ter bestrijding van	bladluizen
Toepassingswijze	20 ml/1000 planten. De oplossing wordt meegedruppeld in het kraanvlak.
Toepassingsstadium vijand	als noodmaatregel wanneer plaatselijk veel luizen aanwezig zijn
Driftreducerende maatregelen	/

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor schadegevallen of ongevallen die zouden voortvloeien uit de hierboven vermelde toepassingen. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de gebruiker

[begin](#)

Publicatie : 2009-07-28